

## 五加皮

## ACANTHOPANACIS CORTEX

(正品：五加皮；混淆品：香加皮)

## ● 正品：五加皮

## 【基原】

五加科Araliaceae植物細柱五加*Acanthopanax gracilistylus* W. W. Smith之乾燥根皮。

## 【原植物形態】

灌木，高2~3 m。枝灰棕色，軟弱而下垂，無毛，節上疏生反曲扁刺。小葉5，稀3~4，在長枝上互生，在短枝上簇生；葉柄長3~8 cm，無毛，常有細刺；小葉片膜質至紙質，幾無柄，倒卵形至倒披針形，長3~8 cm，寬1~3.5 cm，先端尖，基部楔形，邊緣有細鈍齒，兩面無毛或沿脈疏生剛毛，側脈4~5對。繖形花序單個，稀2個腋生或頂生在短枝上，直徑約2 cm，有花多數；總花梗長1~2 cm，果後延長，無毛，花梗細長，長6~10 mm，花黃綠色；萼近全緣或有5小萼齒，花瓣5，長圓狀卵形，長2 mm，先端尖；雄蕊5，花絲長約2 mm；子房2室；花柱2，細長。果實扁球形，長約6 mm，寬約5 mm，黑色，宿存花柱長約2 mm，反曲。花期4~8月，果期6~10月。

## 【原藥材性狀】

不規則捲筒狀，長5~15 cm，直徑0.4~1.4 cm，厚約0.2 cm。外表面灰褐色，有稍扭曲的縱皺紋及橫長皮孔樣疤痕；內表面淡黃色或灰黃色，有細縱紋。體輕，質脆，易折斷，斷面不整齊，灰白色。氣微香，味微辣、苦。

## 【飲片性狀】

不規則的厚片。外表面灰褐色，有稍扭曲的縱皺紋及橫長皮孔樣斑痕；內表面淡黃色或灰黃色，有細縱紋。切面灰白色。體輕，質脆，易折斷，斷面不整齊，灰白色。氣微香，味微辣、苦。

## ● 混淆品：香加皮

## 【基原】

蘿藦科Asclepiadaceae植物杠柳*Periploca sepium* Bge.之乾燥根皮。

## 【原植物形態】

多年生草本或亞灌木，高2 m，具乳汁。莖直立，有分枝。葉對生，長圓形、長圓狀披針形或卵狀披針形，長6~10 cm，寬1.5~2.5 cm，先端急尖或鈍圓，基部楔形或圓形；葉柄長約3 mm。聚繖花序腋生；苞片披針形，長約4 mm；花萼5裂，裂片披針形或卵狀披針形，長約3 mm，花冠鐘形，先端5裂，裂片短於花冠管，紫紅色；雄蕊5，著生於花冠管基部；心皮2，離生，胚珠多數。蓇葖果2，長10~15 cm；種子多數，頂端有白毛。花期7~8月，果期7~9月。

【原藥材性狀】

捲筒狀或槽狀，少數呈不規則的塊片狀，長3~10 cm，直徑1~2 cm，厚0.2~0.4 cm。外表面灰棕色，栓皮鬆軟常呈鱗片狀，易剝落。內表面淡黃色或淡黃棕色，較平滑，有細縱紋。體輕，質脆，易折斷，斷面不整齊，黃白色。有特異香氣，味苦。

【飲片性狀】

不規則的厚片。外表面灰棕色或黃棕色，栓皮常呈鱗片狀。內表面淡黃色或淡黃棕色，有細縱紋。切面黃白色。有特異香氣，味苦。

※註釋：名稱混淆。

●原植物圖片



細柱五加



杠柳

● 藥材圖片

■ 不規則捲筒狀，外表灰褐色，有扭曲縱皺紋及橫長皮孔



■ 內表面色深，有細縱紋

1 cm

五加皮

■ 捲筒狀或槽狀，外表面灰棕色或黃棕色，栓皮鬆軟常呈鱗片狀，易剝落



■ 內表面淡黃色，較平滑，有細縱紋

1 cm

香加皮

● 飲片圖片



五加皮

1 cm



香加皮

1 cm