

枳實

AURANTII IMMATURUS FRUCTUS

(正品：枳實；混淆品：綠衣枳實)

● 正品：枳實

【基原】

芸香科Rutaceae植物酸橙*Citrus aurantium* L.及其栽培變種或甜橙*Citrus sinensis* Osbeck之乾燥幼果。

【原植物形態】

- 1.酸橙：同「橙皮」內文。
- 2.甜橙：同「橙皮」內文。

【原藥材性狀】

1.酸橙：卵圓形，直徑1~3 cm。外表面暗棕綠色，具顆粒狀突起和皺紋。切面光滑而稍隆起，灰白色，厚0.3~0.7 cm，邊緣散有1~2列凹陷油點，瓢囊7~12瓣，中心有棕褐色的囊，呈車輪紋，質堅硬。

2.甜橙：圓球形，直徑1~2.5 cm，果實外皮黑褐色，較平滑，具微小顆粒狀突起。切面類白色，厚0.2~0.4 cm，瓢囊8~11瓣。

【飲片性狀】

1.酸橙：半圓形或全圓形切片，直徑1~3 cm，厚約0.2~0.4 cm，外皮棕綠色，切面邊緣有油點。中果皮寬，黃白色或黃褐色，表面平滑稍隆起，約佔半徑1/2，中心有瓢囊7~12瓣，深棕褐色。質堅，氣清香，味苦、微酸。

2.甜橙：半圓形或全圓形切片，直徑1~2.5 cm，厚約0.2~0.4 cm，外皮棕綠色至黑褐色，較平滑，切面邊緣有油點。中果皮寬，約佔半徑1/3，中心有瓢囊8~11瓣，灰棕色。質堅，氣清香，味苦、微酸。

● 混淆品：綠衣枳實

【基原】

芸香科Rutaceae植物枸橘*Poncirus trifoliata* (L.) Raf.之乾燥幼果。

【原植物形態】

落葉灌木或小喬木。莖無毛；分枝多，小枝呈扁壓狀。莖枝具腋生粗大的棘刺，長1~5 cm，刺基部扁平。葉互生，三出複葉；葉柄長1~3 cm，寬2~5 mm；頂生小葉倒卵形或橢圓形，長1.5~6 cm，寬0.7~3 cm，先端微凹或圓，基部楔形，邊緣有不明顯小鋸齒；側生小葉較小，橢圓狀卵形，基部稍偏斜，幼嫩時在主脈上有短柔毛，具半透明油腺點。花白色，具短柄，單生或成對生於二年生枝條葉腋，常先葉開放，有香氣；萼片5，卵狀三角形，長5~6 mm；花瓣5，倒卵狀匙形，長1.5~3 cm，寬0.5~1.5 cm；雄蕊8~20或更多，長短不等；雌蕊1，子房近球形，密被短柔毛，6~8室，每室具數枚胚珠，花柱粗短，柱頭頭狀。柑果球形，直徑2~5 cm，熟

時橙黃色，密被短柔毛，具很多油腺，芳香，柄粗短，宿存於枝上。種子多數。花期4~5月，果期7~10月。

【原藥材性狀】

球形，直徑約2.5~3.5 cm。外果皮灰綠色或綠黃色，密被細絨毛。果實頂端有明顯的果柄痕或花柱痕跡。斷面中果皮寬，呈黃白色或淡棕色，約佔半徑1/4。瓢囊5~7瓣，深棕褐色。

【飲片性狀】

半圓形或全圓形切片，直徑2.5~3.5 cm；外表面綠褐色，密被棕綠色毛茸，基部具圓盤狀果柄痕，中果皮較薄；剖面類白色，邊緣綠褐色，可見凹陷的小點，瓢囊黃白色或深棕褐色，較少，約5~7瓣；味苦、澀。

※註釋：形態及名稱混淆。

●原植物圖片



酸橙

●原植物圖片




甜橙




枸橘

● 飲片圖片



枳實 - 酸橙

1 cm



枳實 - 甜橙

1 cm

■ 瓢囊8瓣以下



綠衣枳實

1 cm